

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 10-5-89095260



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 138
du 23 Février 1989

PECHER

Toutes les variétés devraient avoir reçu un traitement contre la cloque du pêcher.

DESHERBAGE DE LA VIGNE

La solution "passe partout", n'existe pas en matière de desherbage de la vigne et de nombreux problèmes se posent actuellement comme la modification de la flore, le développement des plantes vivaces comme la garance, résistance de certaines dicotylédones vivaces, recrudescence des panics, setaires et digitaires, le coût des produits rentre également en compte.

--> Sur les jeunes vignes de moins de 4 ans, le DEVRINOL LF reste le seul herbicide de prélevée intéressant mais son spectre d'activité n'est pas complet. Sont également autorisés AMEX et le CARAZOL (sur vignes de 2 ans).

--> Sur vignes de plus de 4 ans, raisonner en fonction de la végétation attendue.

1°) Si les dicotylédones sont en majorité, un apport fractionné de l'herbicide est nécessaire surtout pour les produits à base de diuron (VEGEPRON DS, PERAL vigne, CLERY, FENICAN, CLAIRSOL 85). La première application est à réaliser en février, la seconde courant mai. Une nouvelle association de simazine + isoxaben a obtenu une APV (SEXTAN). S'il y a des adventices déjà développées, recourir à l'emploi de paraquat, diquat, aminotriazole ou glufosinate.

2°) Si les graminées estivales sont en majorité, la lutte sera basée sur des applications de prélevée (apport fractionné de spécialité à base de diuron est également une bonne solution). Il est souvent nécessaire d'ajouter un post-levée. D'autres herbicides peuvent être intéressants (VITIDOR, ZORIAL,).

L'utilisation d'anti graminées spécifiques (ex FERVINAL, FUSILADE, TARGA GALANT) est une solution de rattrapage. La meilleure efficacité de ces produits sera obtenue en intervenant au stade 3 à 5 feuilles des graminées par un temps poussant. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'efficacité sera réduite.

EFFICACITE DE QUELQUES HERBICIDES

HERBICIDES UTILISABLES SELON LES PROBLEMES RENCONTRES (dicotylédones graminées)									
spécialités	Firmes	dose/ha	EFFICACITE SUR MAUVAISES HERBES						
			Amara.	Chénop	Erigér	Renouée pers.	PSD	prêle	Coût F. H.T./ha
VEGEPRON DS	RSR	12 L	*	**[*]	**[*]	0	*	0	340,8
VEGEPRON DS	RSR	7+7 L	***	***	***	*	***	0	397,6
CLAIRSOL 85	RSR	18 L	*	**[*]	**[*]	0	**[*]	0	671,4
CLAIRSOL 85	RSR	9+9 L	***	***	***	*	***	0	671,4
FENICAN	Ciba G.	7 L	*	**[*]	**[*]	0	**[*]	0	466,2
FENICAN	Ciba G.	5+3 L	***	***	***	*	***	0	532,8
PERAL VIGNE	SIPCAM	6 L	*	**[*]	**[*]	0	**	0	285
VITIDOR	Elanco	13 L	***	***	*	0	***	0	1062,1
SEXTAN	Elanco	7,5L	***	***	***	*	*	-	932,3
ZORIAL	Sandoz	2,5L	*	*	*	-	***	0	543,8
PREFIX G	A.Shell	70kg	***	***	**	***	**	***	3330
SURFASOL G	Quino	90kg	***	***	**	***	**	***	4100
ANTIGRAMINEES	de POST	LEVEE	0	0	0	0	***	0	

EFFICACITE: ***: bonne **: moyenne *: insuffisante 0: nulle
 **[*]: pas parfaite mais acceptable dans la majorité des situations.
 -: absence de renseignements.

DOSE/HA: Les doses indiquées sont les doses habituellement utilisées. En sols filtrants et/ou pauvres en argiles, il est souvent nécessaire d'appliquer des doses moindres. Dans tous les cas, lire attentivement les recommandations inscrites sur l'emballage.

COUT (Hors-taxes) / ha

D'après LE COUT des FOURNITURES EN VITICULTURE 1989, H Marcelin & L Fleck, ITV, SUAD.
 Ces coûts ne sont qu'indicatifs. Ils ne doivent être utilisés qu'à titre de comparaison. Il est normal qu'ils ne correspondent pas exactement à ceux que vous pourrez rencontrer chez votre fournisseur.

(C) - SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX - 1989 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.